




Kyyn purema koiralla



KYY on Suomen ainoa myrkyllinen käärme. Kyynpuremaan kannattaakin aina suhtautua vakavasti, sillä se voi olla koiralle kohtalokas.



Kyyn pureman oireet koiralla


Kyyn pureman tavallisin oire on voimakas turvotus purema-alueella. Koira muuttuu usein vaisuksi ja voimattomaksi, joskus esiintyy oksentelua, kuolaamista ja muita oireita. Purema-alue on kosketusarka ja iholla voi olla sinerrystä, myös kyyn neulanpistomaiset hampaanjäljet voivat olla näkyvissä. Oireiden voimakkuuteen vaikuttavat monet seikat, mm. koiran ikä ja koko, pureman sijainti ja ruiskutetun myrkyt määrät.



Lepo on paras ensiapu kyyn puremaan

Jos epäilet, että koiraasi on purrut kyy, ole välittömästi yhteydessä eläinlääkäriin. Pidä koira levossa ja vältä puremakohdan käsitteilyä ja liikuttelua estääksesi myrkyt leviämisen sen elimistöön.



Älä anna ensiavuksi kyytabletteja, sillä kyytablettien sisältämä kortisoni voi peittää tai pahentaa oireita ja hidastaa ja hankaloittaa hoitoa.



Ainoastaan silloin, jos koirallasi on hengitysvaikeuksia aiheuttava voimakas turvotus pään alueella, voi kyytableteista olla hyötyä.

Eläinlääkäriltä nesteytystä, kivunlievitystä ja vasta-ainetta


Kyyn myrkyt vaikuttaa koiran verenkiertoelimistöön ja hyytymisjärjestelmään ja siksi se tarvitsee eläinlääkärin antamaa hoitoa.



Animagi-eläinlääkäriasemalla koiran tila arvioidaan, sille annetaan suonensisäistä nestehoitoa ja kivunlievitystä ja vakavissa tapauksissa myös kyyn myrkyt vasta-ainetta. Joskus koira saattaa tarvita suonensisäistä nestehoitoa usean vuorokauden ajan.

Kyyn pureman hoitoon tarvittavaa vasta-ainetta on saatavilla useilla Animagi-eläinlääkäriasemilla ympäri Suomen ja potilas voidaan myös muilta eläinlääkäriasemilta ohjata jatkohoitoon sellaiselle asemalle, missä vasta-ainetta on saatavilla. Huolehdimme myös tarvittavasta seurannasta hoidon jälkeen.


Tunnista käärmeet:



KYY
Selässä sahalaitakuvio



RANTAKÄÄRME
Niskassa keltaiset, oranssit tai valkoiset täplät. Myrkytön.



VASKITSA
Väri kiiltävän hiekan- tai kuparinruskea. Lisko.

Kyyn myrkyssä on useita eri toksiineja, joilla on suora munuais- toksinen sekä sydänlihastoksinen vaikutus. Myrkyt aiheuttaa verisuonten seinämävaurion, jolloin nestettä, proteiineja ja verisoluja tihkuu suonista kudoksiin. Lisäksi myrkyt aiheuttaa proteiinien hajoamista. Tästä aiheutuu veritilavuuden lasku, anemia, hyytymishäiriöitä, verenpaineen lasku ja punasolujen rikkoutumista verisuonissa. Keuhkoihin voi muodostua keuhkopöhö.

Puremakohtaan muodostuu voimakas kivulias turvotus, joka tavallisesti leviää vähitellen ihon alle myös muualle kehoon. Muita oireita ovat oksentelu, kuivuminen ja depressio. Myöhäisempiä oireita ovat lihasjäykkyys ja liike- ja tuntohäiriöt.

